

Correction des TP1 et TP2 :

Jeux de données

Analyser le tableau 1

Nous pouvons observer que le nombre de systèmes homologues à ComED est très variable d'un génome à l'autre.

S. dysgalactiae	S. equi	S. gallolyticus	S. gordonii
5	5	6	2
S. mitis	S. mutans	S. oralis	S. parauberis
4	2	2	4
S. pneumoniae	S. pyogenes	S. salivarius	S. sanguinis
4	3	9	2
S. thermophilus	S. uberis		
2	6		

	HK	RR
S. dysgalactiae	3	2
S. equi	3	2
S. gallolyticus	3	3
S. gordonii	1	1
S. mitis	2	2
S. mutans	1	1
S. oralis	1	1
S. parauberis	3	1
S. pneumoniae	2	2
S. pyogenes	2	1
S. salivarius	5	4
S. sanguinis	1	1
S. thermophilus	1	1
S. uberis	4	2

Ces systèmes sont absents de *S. agalactiae* et *S. suis*. Ils sont présents à un nombre variable d'exemplaires même dans le même groupe taxonomique. Cette versatilité suggère des événements de gains/pertes de gènes récents au cours de l'évolution. Si nous utilisons la proximité chromosomique pour reconstruire les systèmes, nous observons que le nombre de partenaires histidine kinase (HK) peut varier de un à trois (*S. uberis*), un et deux partenaire HK étant ce qu'il est trouvé de plus fréquent. Nous pouvons observer que l'annotation fonctionnelle des séquences donne peu d'information sur leur fonction biologique, de même les noms de gènes/protéines utilisés sont très peu fiables.

Alignement multiples des séquences homologues a ComE de *S. pneumoniae*

L'alignement obtenu est de très bonne qualité avec très peu d'insertions/délétions (indels) en dehors des régions Nter et Cter. Une variabilité au niveau de la partie Nter des protéines est souvent observée en raison de la difficulté de prédire correctement les débuts des gènes. Ces régions peuvent être éditées pour supprimer les indels mais cela aura peu de répercussions sur les reconstructions d'arbres (les changements topologiques observés sont associés à des branches faiblement supportées). En effet, par défaut les méthodes basées sur une distance éliminent les colonnes comportant au moins une délétion et les méthodes basées sur le maximum de vraisemblance prennent en compte efficacement les délétions.

Si vous réalisez l'alignement des séquences ComE avec clustalo (Clustal Omega), vous observerez quelques différences dans la localisation des indels. Sur cet exemple, le choix du logiciel pour réaliser l'alignement aura peu d'impact sur la reconstruction des arbres.

Muscle

```
seq=0 103 189
SgalA01.FASA1 TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SgorA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--VTKANLIDEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpneA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsanA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--LTKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SmitA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SoraA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SgalA01.FASA TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SmitA01.SPIR2 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StdyA01.FASA_1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StheA01.ABJ66794.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SmutA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SequA01.ACG62860.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpneA01.RR13 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpyoA01.AAK33322.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StdyA01.FASA_2 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsalA01.RR09 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SgalA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SequA01.FASA TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SubeA01.FASA TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SparA01.AEF26142.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SubeA01.CAR41219.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsalA01.CCB96178.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SepiA01.AAO5237.1 TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SaurA01.AGRA TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
```

Clustal Omega

```
seq=0 103 189
SgalA01.FASA1 TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SgorA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--VTKANLIDEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpneA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsanA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--LTKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SmitA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SoraA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SgalA01.FASA TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SmitA01.SPIR2 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StdyA01.FASA_1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StheA01.ABJ66794.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SmutA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SequA01.ACG62860.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpneA01.RR13 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SpyoA01.AAK33322.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
StdyA01.FASA_2 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsalA01.RR09 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SgalA01.COME TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SequA01.FASA TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SubeA01.FASA TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SparA01.AEF26142.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SubeA01.CAR41219.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SsalA01.CCB96178.1 TTHSEFALLIFKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--FITKSLIEDVDVDFEVSFGHEIIEPEEDILYFETGSPVRRVY
SepiA01.AAO5237.1 TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
SaurA01.AGRA TTHSEFTLLVYKQVNSALDFIDKIDSDLAIKENLQACI--KKVVEGQVR-LSDDTFFENNKIWRIFPEDDILYFETA-EARRIML
```

Construction des arbres en utilisant la méthode de distance NJ

Remarques : seule la longueur des branches horizontales est significative et chaque valeur de bootstrap est associée à une bi-partition de l'arbre.

La rotation des branches autour des nœuds (swap) ne change pas les bi-partitions et les longueurs de branches, l'arbre conserve sa topologie. Les arbres obtenus ne sont pas enraciné. Par défaut, le logiciel utilise la méthode du point médian. Comme nous disposons d'un groupe externe (*Staphylococcus epidermidis* et *Staphylococcus aureus*), nous allons l'utiliser pour enraciner tous nos arbres. Le nœud ancêtre sera sur la branche reliant ce groupe externe aux autres séquences. Cet enracinement permet d'orienter l'arbre (distinguer les nœuds pères des nœuds fils) et donc les différents événements qui se sont produits au cours de l'évolution.

Format Newick


```
((SaurA01.AGRA:0.07724,SepiA01.AAO5237.1:0.03460):0.63758,(((SoraA01.COME:0.03309,(SmitA01.COME:0.00189,SpneA01.COME:0.00271)100:0.02865)100:0.16585,SsanA01.COME:0.15999)63:0.02846,SgorA01.COME:0.20679)100:0.31145,(SubeA01.CAR41219.1:0.50854,(((SsalA01.RR09:0.22188,SgalA01.FASA:0.26463)94:0.07901,StdyA01.FASA_1:0.31770)27:0.00995,(((SpneA01.RR13:0.02410,SmitA01.SPIR2:0.02292)100:0.23804,SequA01.ACG62860.1:0.28026)100:0.10241,SmutA01.COME:0.25764)56:0.02946)30:0.00579,((SsalA01.CCB96178.1:0.28979,((SparA01.AEF26142.1:0.11551,(SequA01.FASA:0.06998,(StdyA01.FASA_2:0.05534,SpyoA01.AAK33322.1:0.05650)84:0.02009)100:0.07856)80:0.02830,SubeA01.FASA:0.12754)100:0.08488)93:0.09193,StheA01.ABJ66794.1:0.69047)75:0.05891)62:0.05919,(SgalA01.COME:0.33494,SgalA01.FASA1:0.43487)65:0.05123)37:0.03511)55:0.06021):0.03356)100;
```

Exemple : le sous arbre (SgalA01.COME:0.33494,SgalA01.FASA1:0.43487)65:0.05123 0.33494, 0.43487 longueurs des branches des feuilles au dernier ancêtre commun et 0.05123 longueur de la branche de cet ancêtre au nœud suivant. Cette branche, qui sépare SgalA01.COME et SgalA01.FASA1 de toutes les autres feuilles, a un support de bootstrap de 65%.


Comparaison topologie obtenue avec distance de Poisson et Kimura (approximation de la distance PAM)

Nous pouvons remarquer que les branches ont des longueurs plus grandes avec la méthode Kimura en particulier pour les branches les plus profondes (noter la différence d'échelle entre les deux topologies).

Distance de Poisson et Kimura, longueurs des branches





Distance de Poisson et Kimura, valeurs de Bootstraps



Les valeurs de bootstraps sont globalement un peu meilleures avec Kimura.

Nous pouvons remarquer que les séquences semblent évoluer à peu près à la même vitesse (elles sont alignées verticalement) sauf la séquence StheA01.ABJ66794.1 qui montre clairement une accélération.


Congruence des arbres obtenus avec les distances de Poisson et Kimura



Attention, les deux arbres ne sont pas exactement congruents (cercles bleus) ! Comme précédemment, les longueurs de branches n'ont pas de signification phylogénétique.


Relation entre les distances d'arbres Poisson/ Kimura

On observe une bonne corrélation entre les distances obtenues avec les deux modèles pour les petites distances. Par contre, il y a un décrochage très net pour les distances > 0.5 . Cela montre que la distance de Poisson sous-estime les distances 'réelles' par rapport à la distance de Kimura quand la divergence augmente entre les paires de séquences.




Construction des arbres en utilisant une méthode du maximum de vraisemblance

Nous observons des changements topologiques important entre ces deux arbres. Le plus important concerne la position de la séquence StheA01.ABJ66794.1 qui est radicalement différente. Nous pouvons également observer une perturbation générale qui conduit à un décalage des groupes de séquences par rapport à la verticale, ce qui traduit des vitesses relatives d'évolution différentes pour ces groupes. La topologie obtenue avec la méthode PhyML LG suggère l'existence de quatre clades. Les valeurs de bootstrap sont un peu meilleures pour la méthode PhyML LG mais restent faibles pour les régions incompatibles entre les deux arbres.




Informations données lors du déroulement du programme PhyML :


- 269 patterns found (out of a total of 272 sites) : 269 sites ont été utilisés pour le calcul de l'arbre
- 30 sites without polymorphism (11.03%) : 30 positions invariantes dans l'alignement
- **Log likelihood of PhyML LG 4 tree: -7848.341886.**



Relation entre les distances d'arbres BioNJ Kimura / PhyML LG


Kimura versus PhyML





La corrélation est beaucoup moins bonne que celle observée précédemment. Nous observons une sous-estimation des distances par la méthode BioNJ Kimura en regard de la méthode PhyML LG. De plus, il y a une dispersion importante des points suggérant un traitement différent des substitutions observées entre les paires de séquences.

Comparaison des bipartitions des trois arbres




Nous observons trois sous arbres stables selon toutes les méthodes (le noir, outgroup; le bleu correspondant aux séquences de ComE; le vert correspondant aux séquences des régulateurs de réponse (RR) du système Fas). Le quatrième groupe de séquences (en rouge) qui se retrouve entre le groupe bleu (Com) et le groupe vert (Fas) présente plus de variabilité topologique en fonction des

méthodes car nous observons beaucoup de multifurcations. De même, la localisation du groupe fas (vert) par rapport à ce groupe rouge est différente suivant les topologies.

Edition et annotation des arbres

Nous pouvons faire les mêmes remarques que précédemment. Les quatre groupes de séquences apparaissent très clairement. Nous avons confirmation que les incongruences entre les arbres sont imputables aux feuilles du groupe rouge. Il est à noter que ce groupe est monophylétique avec la méthode PhyML matrice LG (support de aLTR > 0.80).

```
layout(matrix(1:3, 1, 3));
plot.phylo(tP, cex=0.6, tip.color=col);
title('NJ Poisson');
plot.phylo(tK, cex=0.6, tip.color=col);
title('NJ Kimura');
plot.phylo(tLG, cex=0.6, tip.color=col);
title('PhyML LG');
layout(1);
```



En rapport avec la question biologique que nous sommes posée, à savoir si la différence entre les temps de latence observée chez *S. pneumoniae* et *S. mutans* entre le moment où le CSP a été ajouté et celui où la transcription des gènes précoces est observée peut s'expliquer en analysant les protéines impliquées dans la régulation du processus, nous pouvons observer que la séquence de ComE de *S. mutans* appartient au groupe rouge, comme les séquences BlpR de *S. pneumoniae* (SpneA01.RR13, Blp: **Bacteriocin-like peptide**) et non au groupe bleu renfermant la séquence de ComE de *S. pneumoniae*. Les gènes *comE* de *S. mutans* et *S. pneumoniae* sont donc paralogues et non pas orthologues, ce qui suggère des différences fonctionnelles.

Fas (fibronectin/fibrinogen binding/haemolytic activity/streptokinase regulator)

Recherche du modèle évolutif le plus adapté à l'alignement ComE

```

*****
MODEL OPTIMIZATION
*****

ProtTest options
-----
Alignment file..... :
C:\Users\fichant\Documents\Phylogenie\Phylogenomic\cours-
TD\TD_phylo\2012\TP1\SpneA01.COME_CleanUp_muscle.phy
Tree..... : BioNJ
StrategyMode..... : Fixed BIONJ JTT
Candidate models..... :
Matrices..... : JTT LG WAG Blosum62
Distributions..... : +G Uniform
Observed frequencies... : true
*****
Model..... : LG
Number of parameters..... : 47 (0 + 47 branch length estimates)
-lnL..... = 8568.97
(second)

Model..... : LG+F
Number of parameters..... : 66 (19 + 47 branch length
estimates)
aminoacid frequencies..... = observed (see above)
-lnL..... = 8543.93
(second)

Model..... : LG+G
Number of parameters..... : 48 (1 + 47 branch length estimates)
gamma shape (4 rate categories).. = 1.0
-lnL..... = 8272.77
(second)

Model..... : LG+G+F
Number of parameters..... : 67 (20 + 47 branch length
estimates)
gamma shape (4 rate categories).. = 1.0
aminoacid frequencies..... = observed (see above)
-lnL..... = 8235.34

*****
AKAIKE INFORMATION CRITERION
*****

*****
Best model according to AIC: LG+G+F
Sample Size: 272.0
Confidence Interval: 100.0
*****

```

Model	deltaAIC	AIC	AICw	-lnL
LG+G+F	0.00	16604.68	1.00	-8235.34
LG+G	36.86	16641.54	0.00	-8272.77
WAG+G+F	84.02	16688.70	0.00	-8277.35
JTT+G+F	109.99	16714.68	0.00	-8290.34
WAG+G	189.53	16794.21	0.00	-8349.11
Blosum62+G+F	214.22	16818.90	0.00	-8342.45
JTT+G	248.35	16853.03	0.00	-8378.52

Blosum62+G	281.14	16885.83	0.00	-8394.91
WAG+F	574.31	17179.00	0.00	-8523.50
LG+F	615.17	17219.86	0.00	-8543.93
WAG	626.67	17231.35	0.00	-8568.68
LG	627.26	17231.94	0.00	-8568.97
Blosum62+F	662.16	17266.85	0.00	-8567.42
JTT+F	698.27	17302.96	0.00	-8585.48
Blosum62	698.71	17303.39	0.00	-8604.70
JTT	806.17	17410.85	0.00	-8658.43

Les modèles +G et +G+F avec la matrice LG sont les plus vraisemblables. Nous pouvons remarquer que pour chaque matrice les modèles +G+F devancent les modèles plus simples.

Alignement multiples des séquences homologues a ComD de *S. pneumoniae*

Recherche du modèle évolutif le plus adapté à l'alignement ComD

MODEL OPTIMIZATION

ProtTest options

```
-----
Alignment                               file..... :
D:\Enseignement\TD3\2012\Results\ComD\SpneA01.COMD_CleanUp_muscle.fst
Tree..... : BioNJ
StrategyMode..... : Fixed BIONJ JTT
Candidate models..... :
  Matrices..... : JTT LG WAG Blosum62
  Distributions..... : +G Uniform
  Observed frequencies... : true
```

AKAIKE INFORMATION CRITERION

Best model according to AIC: LG+G+F

Sample Size: 475.0

Confidence Interval: 100.0

Model	deltaAIC	AIC	AICw	-lnL
LG+G+F	0.00	49641.79	1.00	-24741.89
JTT+G+F	148.20	49789.98	0.00	-24815.99
WAG+G+F	213.60	49855.39	0.00	-24848.70
LG+G	412.43	50054.22	0.00	-24967.11
Blosum62+G+F	466.35	50108.14	0.00	-24975.07
Blosum62+G	864.39	50506.17	0.00	-25193.09
WAG+G	901.37	50543.15	0.00	-25211.58
JTT+G	928.68	50570.47	0.00	-25225.24
WAG+F	1302.05	50943.83	0.00	-25393.92
Blosum62+F	1357.13	50998.92	0.00	-25421.46
JTT+F	1365.50	51007.29	0.00	-25425.64
LG+F	1392.76	51034.55	0.00	-25439.27
Blosum62	1627.57	51269.35	0.00	-25575.68

LG	1663.27	51305.06	0.00	-25593.53
WAG	1880.42	51522.20	0.00	-25702.10
JTT	2080.67	51722.46	0.00	-25802.23


Le modèle LG+G+F est le plus vraisemblable comme dans le cas de ComE. Par contre, les modèles suivants ne changent que la matrice, ainsi pour chaque matrice les modèles +G+F devanent les modèles plus simples.

Construction de l'arbre des protéines ComD en utilisant le modèle le plus adapté et une méthode du maximum de vraisemblance


476 patterns found. (out of a total of 483 sites)

21 sites without polymorphism (4.35%)

Log likelihood of the current tree: -23644.844815




Comparaison des arbres obtenus sur les séquences homologues à ComD et à ComE: interprétation biologique




Arbre consensus

Un des cinq arbres ne possède que 17 feuilles (tips) alors que les autres en possèdent 18. On ne peut calculer un arbre consensus que si les différents arbres ont exactement les mêmes feuilles, d'où le refus de la méthode quand nous demandons le consensus avec les 5 arbres. En supprimant l'arbre incriminé, nous obtenons l'arbre suivant qui confirme une totale incongruence entre les différents arbres (que des multifurcations) car aucune bifurcation commune, excepté pour SsaA et StheA.




Arbre obtenu en concaténant les 5 alignements (méthode PhyML, matrice LG paramètres par défaut).




L'arbre obtenu en concaténant 5 fichiers est remarquablement cohérent avec la classification en groupe des Streptocoques. Nous pouvons également remarquer de bonnes valeurs de support des branches (aLRT).


Arbre obtenu sur l'alignement concaténé des 43 familles de protéines avec la méthode NJ distance de Kimura



Arbre obtenu sur l'alignement concaténé des 43 familles de protéines avec PhyML



Quelle que soit la méthode utilisée, les arbres ont exactement la même topologie avec de très bonnes valeurs de bootstrap, ce qui suggère que l'alignement des 43 protéines ribosomiques contient suffisamment d'information phylogénétique pour résoudre les relations phylogénétiques entre ces espèces. Nous pouvons néanmoins observer que la branche menant à *S. pneumoniae*, et *S. mitis* a une très faible valeur de aLRT avec PhyML. Ce résultat pourrait être dû à la faible divergence des protéines ribosomiques qui n'apporteraient pas suffisamment d'information pour les espèces qui auraient divergées récemment.




Comparaison de la topologie de l'arbre obtenu sur ComE avec l'arbre des espèces

Quand nécessaire le sous-arbre des espèces a été extrait pour le mettre en face de la topologie des sous-groupes de ComE (bleu et vert). Il y a une très bonne congruence entre les deux pour le sous-arbre bleu des séquences ComE (et même meilleur avec ComD !). Nous voyons cependant pour les autres sous-groupes, quelques différences avec l'arbre des espèces.

Pour le sous-arbre rouge, *S. equi* est à une place non attendue par rapport à la phylogénie des espèces. *Sgal* possède 3 paralogues dont deux sont correctement placés avec *Sube* et pourraient correspondre à une duplication dans *Sgal*. Par contre, le sous-groupe formé par la troisième copie de *Sgal* et *SsalA1.RR9* pose un problème.


Dans le sous-arbre vert, seule la séquence de *Spar* pose un petit problème car elle ne possède pas un ancêtre commun avec *Sube* mais cependant se branche juste après *Sube* en groupe externe de *Spyo*, *Stdy* et *Sequi*.



Comme nous l'avons déjà remarqué, les séquences orthologues à ComE et ComD de *S. pneumoniae* ne sont présentes que dans le groupe *mitis* (groupe bleu). L'arbre obtenu avec les 43 protéines ribosomiques supposé représenter la phylogénie des espèces de Streptocoques montre que les différentes espèces du groupe *mitis* descendent bien d'une espèce ancêtre commune. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que le système ComDE a été acquis par cette espèce ancêtre et hérité ensuite par spéciation par les espèces actuelles.


Cependant, que ce soit dans les arbres obtenus avec une méthode de distance (NJ) ou avec une méthode de maximum de vraisemblance (PhyML), les sous-arbres correspondant aux systèmes ComDE branchent à l'extérieur du sous-arbre comportant les autres séquences. Ceci indique que ce système n'a probablement pas été acquis par duplication mais par transfert horizontal par l'ancêtre commun. En effet une duplication aurait dû se traduire par la topologie d'arbre suivante (idem pour ComE) :

Duplication du gène ancestral




Cette hypothèse d'acquisition par HGT est soutenue par l'observation que l'opéron *comCDE* possède une composition en G+C plus faible de celle de l'ensemble du génome (~30%) et qu'il est bordé par deux gènes codant pour des ARNt, deux caractéristiques associées aux îlots de pathogénies et plus généralement aux transferts horizontaux de gènes.

La cascade de régulation identifiée chez *S. pneumoniae* serait partagée par les autres membres du groupe *mitis*. En effet, chez ces espèces, l'opéron *comCDE* est localisé à proximité de l'origine de réplication du chromosome, elles codent pour un transporteur orthologue à ComAB et possèdent deux copies du gène *comX*.



La compétence est donc régulée chez *S. mutans* par un autre système ComRS.




Régulation de la transformation par le système ComRS. On ne connaît pas la régulation du niveau basal de l'opéron *comRS*, ce pourrait être un signal extracellulaire. Le produit du gène *comS*, le Pre-ComS, est exporté et maturé (ComS*) par un transporteur qui n'a pas encore été identifié. ComS* est importé dans la cellule par le transporteur d'oligopeptides Ami. Dans le cytoplasme, il se fixe à ComR et l'active. ComR activé se fixe sur les boîtes ECom au niveau des promoteurs de *comS* et *comX*, conduisant à une

amplification du signal (boucle auto catalytique) et à l'expression des gènes tardifs. Les protéines ClpC and MecA préviennent l'accumulation de ComX dans les conditions qui ne sont pas optimum pour le développement de la compétence.

Exemple de représentation et annotation des arbres avec iTOL.

Ici l'arbre obtenu avec PhyML sur ComE où les feuilles sont coloriées en fonction de la famille de protéines et les domaines Pfam présents dans ces protéines sont annotés.



Arbre des espèces annoté avec iTOL avec la distribution des différentes familles de protéines dans chacun des génomes

Tree scale: 0.01

